

Brezales y jarales de Europa occidental

Tabla 2
Daboecio-Ulicetum gallii (Br.-Bl. 1967) *as. nova*

Altitud l = 10 m:	98	125	126	130	121	138	140	122	123	122	140
Cobertura:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Exposición:	N	S	S	SO	S	NO	N	N	O	O	O
Area m. cuadrados:	20	40	40	50	40	100	50	100	50	100	50
Nº de orden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Características de asociación y alianza (*Daboecio-Ulicetum gallii*, *Ulicion minoris*):

<i>Ulex gallii</i>	3.4	3.3	3.4	4.5	4.4	3.4	3.4	3.4	1.2	2.2	4.4
<i>Daboecia cantabrica</i>	3.3	2.3	3.3	2.2	1.2	3.3	4.4	2.3	2.3	3.3	3.3
<i>Ulex europaeus</i>	1.2	+2	.	1.2
<i>Arrhenatherum longifolium</i>	+2	.	.	+2	.	.	.

Diferenciales de la subasociación *ericetosum aragonensis*:

<i>Erica australis</i> subsp. <i>aragonensis</i>	1.2	3.4	3.3	1.2
<i>Pterospartum tridentatum</i>	1.2	+2	1.2	.

Características de orden y clase (*Calluno-Ulicetalia*, *Calluno-Ulicetea*):

<i>Calluna vulgaris</i>	1.2	2.3	2.2	1.2	2.2	2.3	1.2	2.2	+2	1.2	+2
<i>Agrostis setacea</i>	2.2	1.2	2.2	1.1	1.1	2.2	1.1	1.2	.	.	+2
<i>Erica cinerea</i>	+2	2.2	2.3	1.2	3.3	.	.	2.2	.	1.2	.
<i>Halimium alyssoides</i>	.	1.2	.	1.2	2.3	.	.	2.2	.	.	.
<i>Lithodora diffusa</i>	+2

Compañeras:

<i>Potentilla erecta</i>	1.1	1.1	1.2	1.1	+2	2.2	1.1	1.1	.	.	1.1
<i>Agrostis tenuis</i>	2.2	+2	1.1	2.2	2.2	1.1	1.1
<i>Vaccinium myrtillus</i>	1.2	3.3	2.3	+2	2.3	1.2	2.2
<i>Erica arborea</i>	1.1	2.2	1.1	+2
<i>Ilex aquifolium</i>	+2	.	.	+
<i>Quercus pyrenaica</i>	+	.	.	+	.	.	.
<i>Anemone trifolia</i> subsp. <i>albida</i>	+	+
<i>Carex caryophyllaea</i>	+	.	.	.	1.1
<i>Hylocomium splendens</i>	3.3	2.3	.

Además: *Quercus robur* en 1, *Cirsium filipendulum* en 3, *Pteridium aquilinum* en 3, *Hypericum pulchrum* en 9, *Blechnum spicant* en 9, *Anemone nemorosa* en 10, *Genista florida* en 10.

Localidades:

1. Triacastela (Lugo)

2-3. Hospital (Lugo)

4. Collado del Hospital (Lugo)

5. Piedrafita del Cebrero (Lugo)

6-7. Puerto del Conio (Asturias)

8. Piedrafita (Lugo)

9-10. El Portelo de Ancares (Lugo)

11. Puerto del Conio (Asturias)