

Brezales y jarales de Europa occidental

Tabla 4  
*Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris* Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964

Altitud 1 = 10 m.:	05	03	07	23	20	52
Cobertura:	100	100	100	100	100	100
Exposición:	N	N	NO	N	E	O
Area m. cuadrados:	20	20	40	20	40	40
Nº de orden:	1	2	3	4	5	6

Características de asociación y alianza (*Cirsio-Ericetum ciliaris*, *Ulicion minoris*):

<i>Erica ciliaris</i>	4.5	3.4	4.4	3.4	3.3	4.4
<i>Daboecia cantabrica</i>	2.3	+2	1.2	+2	1.2	2.2
<i>Cirsium filipendulum</i>	2.2	1.2	+2	+2	2.2	1.2
<i>Ulex europaeus</i>	+2	3.3	2.3	.	.	1.1
<i>Arrhenatherum longifolium</i>	1.2	+2	.	.	1.2	.
<i>Ulex minor</i>	+2	.	+2	2.3	.	.
<i>Ulex gallii</i>	.	.	.	.	3.3	2.3

Características de orden y clase (*Calluno-Ulicetalia*, *Calluno-Ulicetea*):

<i>Erica cinerea</i>	1.2	3.3	2.3	2.3	3.3	1.2
<i>Agrostis setacea</i>	+2	1.1	2.2	2.3	2.3	1.1
<i>Lithodora diffusa</i>	1.2	1.1	+2	+2	.	.
<i>Calluna vulgaris</i>	.	.	1.2	1.2	1.2	2.3
<i>Cistus hirsutus</i>	.	.	+2	.	.	.

Compañeras:

<i>Molinia caerulea</i>	1.1	1.2	.	+2	1.2	+2
<i>Potentilla erecta</i>	+	1.1	.	.	.	1.2
<i>Sieglingia decumbens</i>	.	.	+2	.	+	.
<i>Quercus robur</i>	.	.	.	.	+	+2
<i>Cistus salvifolius</i>	2.2	.	.	.	.	.
<i>Brachypodium pinnatum</i>	.	.	1.1	.	.	.
<i>Hypericum pulchrum</i>	.	.	.	.	+	.

Además: en 2: *Agrostis stolonifera*, *Jasione montana* subsp. *gallaecica*; en 5: *Serratula tinctoria*, *Pteridium aquilinum*; en 6: *Betula celtiberica*, *Agrostis tenuis*.

Localidades:

1-2. Cabo Prior (Coruña)	5. Meride, Vivero (Lugo)
3. Punta Corbeiro (Pontevedra)	6. Candamil, Villalba (Lugo)
4. Vincios (Pontevedra)	